

令和3年4月30日		
資料提供		
担当課室	農業環境・鳥獣害 対策室	農作物病虫害防 除所
担当者	大谷	岡本
電 話	073-441-2905	0736-64-2300

病虫害発生予報 第2号(5月予報) について

令和3年度病虫害発生予報 第2号(5月予報) を別添のとおり発表します。

病害虫発生予報 第2号（5月予報）

和歌山県農作物病害虫防除所

< 予報の概要 >


作物名	病害虫名	発生量	作物名	病害虫名	発生量
水稲	もみ枯細菌病による苗腐敗症	並	カンキツ	かいよう病	並
	ばか苗病	並		そうか病	やや多
	いもち病	並		黒点病	並
	ヒメトビウンカ	やや少		灰色かび病	並
	縞葉枯病	やや少		ミカンハダニ	やや多
	ツマグロヨコバイ	並		ヤノネカイガラムシ	やや少
	イネミズゾウムシ	並		チャノキイロアザミウマ	やや少
タマネギ	灰色かび病 べと病	並	カキ	うどんこ病	並
		多		円星落葉病	やや少
				角斑落葉病	並
キュウリ	べと病 うどんこ病 褐斑病	やや多	モモ	せん孔細菌病	並
		並		カイガラムシ類	少
		やや少		キウイフルーツ	並
野菜全般	アブラムシ類 ハダニ類 アザミウマ類	並	果樹全般	カメムシ類	やや少
		並			
		やや少			

気象予報

近畿地方 1か月予報（04/24～05/23）

2021年04月22日14時30分 大阪管区气象台 発表		
向こう1か月 04/24～05/23	天候	天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。
	降水量	降水量は、平年並または少ない確率ともに40%です。
	日照時間	日照時間は、平年並または多い確率ともに40%です。
1週目 04/24～04/30	気温	1週目は、平年並の確率50%です。
2週目 05/01～05/07	気温	2週目は、平年並または低い確率ともに40%です。
3～4週目 05/08～05/21	気温	3～4週目は、平年並または高い確率ともに40%です。

向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率（%）



I. 水 稲

1. もみ枯細菌病による苗腐敗症

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

① 前年の県内全域におけるもみ枯細菌病の本田での発生面積率は0%（平年1%）であった。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 発病ほ場から採種した種子は使用しない。

② 種子消毒を行う。

2. ばか苗病

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

① 前年の県内全域におけるばか苗病の本田での発生面積率は0%（平年2%）であった。

② 種子消毒に用いる薬剤の効果は安定している。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① もみ枯細菌病による苗腐敗症に準じる。

3. いもち病（苗いもち、葉いもち）

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

① 5月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 田植え時に育苗箱施薬剤を施用する。

4. ヒメトビウンカおよび縞葉枯病

(1) 予報内容 ヒメトビウンカ 発生量 やや少

縞葉枯病 発生量 やや少

(2) 予報の根拠

① 4月上旬の休閑田における捕虫網20回振りすくい取り調査では、和歌山市で2.3頭（平年12.4頭）、紀の川市で3.7頭（平年8.8頭）、かつらぎ町で1.3頭（平年4.2頭）であった。

② 県北部におけるヒメトビウンカ（越冬世代）のイネ縞葉枯病ウイルス保毒虫率は、和歌山市3.3%（平年8.2%）、かつらぎ町1.3%（平年9.5%）であった。

③ 県北部および中部の本田における前年のイネ縞葉枯病の発生面積率は0%（平年9%）であった。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① イネ苗へのヒメトビウンカの飛来を防ぐため、雑草地付近での育苗を避ける。

5. ツマグロヨコバイ

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

① 4月上旬の休閑田における20回振りすくい取り調査による平均生息数は、和歌山市11.0頭（平年15.0頭）、紀の川市で0.3頭（平年5.1頭）、かつらぎ町で72.7頭（平年39.1頭）であった。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 田植え時に育苗箱施薬剤を施用する。

6. イネミズゾウムシ

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

① 那智勝浦町での予察灯による4月1～20日の誘殺数は0頭（平成0.1頭）であった。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 田植え時に育苗箱施薬剤を施用する。

② 5月中旬までに田植えする地域のうち、多発地ではさらに田植え3～4週後に薬剤を処理する。

II. 野 菜

<タマネギ>

1. 灰色かび病（白斑葉枯病）

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

① 県北部での4月下旬の発生ほ場率は0%（平成1%）であった。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① ほ場の排水を良くする。

② 発病葉や収穫後の残さは、ほ場から速やかに持ち出して適切に処分する。

2. ベと病

(1) 予報内容 発生量 多

(2) 予報の根拠

① 県北部での4月下旬の二次感染株の発生ほ場率は47%（平成26%）、発病株率は1.0%（平成1.2%）であった。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① ほ場をこまめに見回り、発病葉を出来るだけ除去し、早急に薬剤散布を行う。除去した葉は袋に入れ、ほ場の外に持ち出して適切に処分する。発病葉は翌年の発生源となるため、集めてほ場の外に持ち出して適切に処分する。

② 孢子飛散による発病の拡大を防ぐため、発生が認められないほ場においても予防散布を徹底する。

③ 薬剤の感受性低下を防ぐため、同一系統の薬剤は連用しない。

④ 排水を良好にし、降雨による浸冠水や停滞水をなくす。

⑤ 収穫後の残さは、ほ場から速やかに持ち出して適切に処分する。

⑥ 令和3年度病害虫発生予察注意報第1号（令和3年4月23日発表）を参照する。

<キュウリ>

1. ベと病

(1) 予報内容 発生量 やや多

(2) 予報の根拠

① 県北部での4月中旬の発生ほ場率は30%（過去9年の平均29%）、発病葉率は4.8%（過去9年の平均2.6%）であった。

② 県中部での4月中旬の発生ほ場率は80%（平成45%）、発病葉率は

22.3%（平年 15%）であった。

③ 5月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 施設栽培では換気を十分に行い、湿度低下を図る。

② 薬剤防除は予防散布を重点に、薬液が葉裏に十分かかるように行う。

2. うどんこ病

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

① 県北部での4月中旬の発生ほ場率は0%（過去9年の平均：発生ほ場率0%、発病葉率0%）であった。

葉率0%）であった。

② 県中部での4月中旬の発生ほ場率は90%（平年73%）、発病葉率は17.0%（平年20.3%）であった。

③ 5月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 施設栽培では換気を十分に行い、湿度低下を図る。

② 薬剤防除は予防散布を重点に、薬液が葉裏に十分かかるように行う。

③ 同一系統の薬剤の連用は耐性菌の発生を助長するので、他系統の薬剤とローテーション散布する。

3. 褐斑病

(1) 予報内容 発生量 やや少

(2) 予報の根拠

① 県北部での4月中旬の発生ほ場率は0%（過去9年の平均：発生ほ場率4%、発病葉率0.2%）であった。

② 県中部での4月中旬の発生ほ場率は10%（過去5年の平均61%）発病葉率は3.6%（過去5年の平均14.2%）であった。

③ 5月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 施設栽培では換気を十分に行い、湿度低下を図る。

② 発病葉や収穫後の残さは速やかに処分する。

③ 資材に付着した病原菌の胞子が伝染源になるので、支柱等再利用する資材は栽培終了後に消毒する。ネットやマルチ等は更新する。

<野菜全般>

1. アブラムシ類

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

① 県北部のキャベツにおける4月中旬の発生株率は、モモアカアブラムシ1.9%（平年12.4%）、ニセダイコンアブラムシ0.6%（平年1.6%）であった。

② 県中部の施設栽培キュウリにおける4月中旬のワタアブラムシの発生ほ場率は10%（過去7年の平均13%）であった。

③ 県中部の施設およびトンネル栽培スイカにおける4月中旬のワタアブラムシの発生ほ場率は50%（過去6年の平均36%）であった。

④ 黄色水盤（紀の川市）への4月1～20日までの飛来数は、108頭（平年84.7頭）であった。

⑤ 5月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 薬剤散布にあたっては薬液が葉裏に十分かかるように行う。

2. ハダニ類

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

- ① 県北部のイチゴにおける4月中旬のナミハダニは発生ほ場率62.5%（平年42.0%）、発生葉率32.9%（平年14.4%）、カンザワハダニは発生ほ場率12.5%（平年21.9%）、発生葉率0.6%（平年4.8%）であった。
- ② 県中部の施設およびトンネル栽培スイカにおける4月中旬の発生ほ場率は60%（過去6年の平均66%）、1葉当たりの生息密度は0.3頭（過去6年の平均0.1頭）であった。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① ハダニ類はほ場の周辺から侵入するので、外縁部の株において早期発見に努め、初期防除を行う。
- ② 薬剤抵抗性の発達を遅らせるために、同一系統の薬剤は連用しない。

3. アザミウマ類

(1) 予報内容 発生量 やや少

(2) 予報の根拠

- ① 県北部のイチゴにおける4月中旬のヒラズハナアザミウマは発生ほ場率37.5%（過去5年の平均57.3%）、1花当たり生息密度0.1頭（過去5年の平均0.9頭）、ミカンキイロアザミウマは発生ほ場率0%（平年：発生ほ場率15.3%、1花当たりの生息密度0.1頭）であった。
- ② 県中部の施設栽培キュウリにおける4月中旬のミナミキイロアザミウマは発生ほ場率30%（過去7年の平均36%）、ミカンキイロアザミウマは発生ほ場率0%（過去7年の平均4%）であった。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 生息密度の低い時期から薬剤防除を行う。

Ⅲ. 果 樹

<カンキツ>

1. かいよう病

(1) 予報内容 発生時期 やや早い（初発日の平年5月24日）
発生量 並

(2) 予報の根拠

- ① 予察ほ場（有田川町奥）における「宮川早生」の展葉期は4月19日（平年4月24日）であった。
- ② 予察ほ場（無防除、有田川町奥）における春葉の越冬病斑の発病葉率は13.0%（平年10.9%）であった。
- ③ 前年10月中旬の県北部（海南市下津町）、県中部、県南部（田辺市）における春葉発病の発生ほ場率は22%（平年20%）、発病葉率は0.4%（平年0.7%）であった。
- ④ 5月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 薬害対策を講じた上で銅水和剤の予防散布を行う。
- ② 罹病枝葉の剪除と防風垣や防風ネットの整備に努める。

2. そうか病

(1) 予報内容 発生時期 やや早い

発生量 やや多

(2) 予報の根拠

- ① 予察ほ場（有田川町奥）における「宮川早生」の展葉期は4月19日（平年4月24日）であった。
- ② 前年10月中旬の県北部（海南市下津町）、県中部、県南部（田辺市）におけるウンシュウミカンの果実発病の発生ほ場率は5%（平年3%）であった。
- ③ 5月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 常発ほ場や前年多発ほ場は発芽直後の防除を基本とするが、発芽直後に防除できなかった場合は早急に散布を行う。
- ② その他のほ場では満開期に黒点病、灰色かび病を防除する際、そうか病にも適用のある薬剤を用いる。

3. 黒点病

(1) 予報内容 発生量（初期感染） 並

(2) 予報の根拠

- ① 5月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 樹上及びほ場内外に放置された枯枝が伝染源となるため早急に処分する。

4. 灰色かび病

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

- ① 5月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 常発ほ場では満開期に防除を行う。
- ② 開花期～落弁期に曇雨天が続くと発生が助長されるので、必要に応じて防除する。

5. ミカンハダニ

(1) 予報内容 発生量 やや多

(2) 予報の根拠

- ① 予察ほ場（有田川町奥）における4月中旬の発生葉率は、無防除区40.0%（平年3.2%）、マシン油乳剤を散布している慣行防除区0%（平年0%）であった。
- ② 5月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 冬期から春期にかけてマシン油乳剤を散布していないほ場では、夏用マシン油乳剤200倍の散布を早急に行う。

6. ヤノネカイガラムシ

(1) 予報内容 発生時期 早い
発生量 やや少

(2) 予報の根拠

- ① 前年10月中旬の発生ほ場率は0%（平年6%）、寄生果率は0%（平年0.3%）であった。
- ② 予察式によると、第1世代1齢幼虫初発日は5月5日（平年5月15日）と予想される。
- ③ 5月の気象予報による。

7. チャノキイロアザミウマ

(1) 予報内容 発生量 やや少

(2) 予報の根拠

① 予察ほ場（無防除）における黄色粘着トラップによる越冬成虫の4月1日～20日の誘殺数は由良町3頭（平年14.9頭）、有田川町0頭（過去7年の平均2.3頭）であった。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 防風樹のイヌマキやサンゴジュの近くでは発生が多くなるので、特に丁寧に薬剤防除を行う。

<カ キ>

1. うどんこ病

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

① 前年10月中旬の「富有」の発生ほ場率は82%（平年78%）、発病葉率は18.0%（平年19.8%）であった。

② 5月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 子のう胞子飛散最盛期は4月下旬～5月上旬であり、この時期に水和硫黄剤を散布する。前年多発したほ場では、この時期の防除を徹底する。

② 4～5月に降水量が少なく、乾燥気味に経過すると発病が助長される。

③ 病原菌は葉裏の気孔から侵入するので、薬液は葉裏をねらって丁寧に散布する。

2. 円星落葉病

(1) 予報内容 発生量 やや少

(2) 予報の根拠

① 前年10月の「富有」における発生ほ場率は0%（平年43%）、発病葉率0%（平年5.3%）であった。

② 5月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 子のう胞子飛散は、5月上中旬から始まり、5月下旬～7月中旬の降雨後に多い。二次感染はしない。

② 薬剤防除は、5月から8月までマンゼブ水和剤、マンネブ水和剤、有機銅水和剤等を定期的に予防散布する。

3. 角斑落葉病

(1) 予報内容 発生量 並

(2) 予報の根拠

① 前年10月の「富有」における発生ほ場率は77%（平年68%）、発病葉率は11.2%（平年12.2%）であった。

② 5月の気象予報による。

(3) 防除上考慮すべき諸点

① 分生子による感染は5月上中旬から始まり、7月中下旬まで続く。二次感染を繰り返す。

② 薬剤防除は、円星落葉病に準ずる。

4. チャノキイロアザミウマ

(1) 予報内容 発生量 やや少

(2) 予報の根拠

① 予察ほ場（無防除、紀の川市粉河）における4月1～20日の黄色粘着トラップによる誘殺数は1頭（平年5.2頭）であった。

- ② 5月の気象予報による。
- (3) 防除上考慮すべき諸点
 - ① 落弁期を中心に防除する。
 - ② 防風樹のイヌマキやサンゴジュの近くでは発生が多くなるので、特に丁寧に薬剤防除を行う。

<モ モ>

1. せん孔細菌病

- (1) 予報内容 発生量 並
- (2) 予報の根拠
 - ① 県北部の4月中旬の発病葉の発生ほ場率は0%（平成14%）、発病葉率は0%（平成0.4%）、発病枝の発生ほ場率は10%（平成24%）、発病枝率は0.1%（平成1.2%）であった。
 - ② 5月の気象予報による。
- (3) 防除上考慮すべき諸点
 - ① 春型越冬病斑形成枝は葉への伝染源となるので剪除する。
 - ② 果実発病は、5月以降の風雨により多くなるので、降雨直前の予防散布を徹底する。予防散布ができなかった場合、降雨後できるだけ早く薬剤散布を行う。
 - ③ 本病の防除薬剤のうち、マイコシールドは連用すると葉先の黄化を生じることがあるので注意する。

2. カイガラムシ類

- (1) 予報内容 発生量 少
- (2) 予報の根拠
 - ① 県北部の4月中旬のウメシロカイガラムシ、クワシロカイガラムシ雌成虫寄生枝の発生ほ場率は0%（平成26%）、寄生枝率は0%（平成1.2%）であった。
 - ② 5月の気象予報による。
- (3) 防除上考慮すべき諸点
 - ① 樹体生育期における防除適期は、第1世代のふ化幼虫発生時期であるため、ふ化幼虫発生盛期の少し前に薬剤散布を実施する。
 - ② 県北部のふ化幼虫発生盛期は、ウメシロカイガラムシが4月29日前後、クワシロカイガラムシが5月6日前後と予想している。

<キウイフルーツ>

1. かいよう病

- (1) 予報内容 発生量 並
- (2) 予報の根拠
 - ① 県北部における4月中旬の発病葉の発生ほ場率は0%（前年0%）であった。
 - ② 5月の気象予報による。
- (3) 防除上考慮すべき諸点
 - ① 新梢の萎れ・黒変や樹液の漏出がみられる枝は、前年枝の基部から切除する。
 - ② 作業に使用した器具類（ハサミ、ノコギリ等）は70%エタノールで消毒する。
 - ③ 風当たりの強いほ場では、防風対策を行う。

<果樹全般>

1. カメムシ類

(1) 予報内容 発生量 やや少

(2) 予報の根拠

- ① 県内 47 地点のチャバネアオカメムシ越冬成虫の捕獲頭数は、落葉 50 リットル当たり 0.1 頭（前年 0.2 頭、平年 0.6 頭）、捕獲地点率は 8.5%（前年 13.0%、平年 22.0%）であった。

(3) 防除上考慮すべき諸点

- ① 果樹カメムシ類の飛来量はほ場間差が大きいので、ほ場内での発生及び被害状況を観察し、防除は発生に応じて早めに行う。
- ② ウメ・モモなどでは、収穫前に越冬成虫の飛来が確認された場合は速やかに薬剤による防除を実施する。
- ③ ウメの被害は品種間差が大きい。小梅類等の収穫の早い品種で集中して加害される傾向があるので、これらの品種では特に注意が必要である。
- ④ カンキツでは蕾、花が加害されるので、被害状況を観察して防除する。
- ⑤ 今後の発生動向については、農業環境・鳥獣害対策室ウェブページ内農作物病虫害防除所の果樹カメムシ情報や、各地域の振興局農業水産振興課、JA等の情報を参考にする。

本情報は、下記の方法でもご覧頂けます。

○**農業環境・鳥獣害対策室ウェブページ** <農作物病虫害防除所>

<https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070300/071400/boujyosyo-yosatsujyouhou.html>

○**和歌山県ホームページ** <わかやま県政ニュース>

<http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/>

※詳しくは、農作物病虫害防除所の各担当までお願いします。

水稲、野菜、花き

本所（紀の川市、農業試験場内）

TEL 0736-64-2300

カンキツ

有田川駐在（有田川町、果樹試験場内）

TEL 0737-52-4320

カキ、モモ

紀の川駐在（紀の川市、果樹試験場かき・もも研究所内）

TEL 0736-73-2274

ウメ

みなべ駐在（みなべ町、果樹試験場うめ研究所内）

TEL 0739-74-3780